

Validierter klinischer Score zur Ermittlung der klinischen Wahrscheinlichkeit einer Lungenembolie: Wells-Score

| Kriterien   | Punkte: Originalversion | Punkte: Vereinfachte Version |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Frühere TVT oder LE                                 | 1,5                     | 1                            |
| Herzfrequenz $\geq$ 100 Schläge/min                 | 1,5                     | 1                            |
| Operation oder Immobilisation im letzten Monat      | 1,5                     | 1                            |
| Hämoptysen  | 1                       | 1                            |
| Tumorerkrankung                                     | 1                       | 1                            |
| Klinische Zeichen einer TVT                         | 3                       | 1                            |
| Alternative Diagnose unwahrscheinlicher als LE      | 3                       | 1                            |
| <b>Klinische Wahrscheinlichkeit: 3-Ebenen-Score</b> |                         |                              |
| Niedrig   | 0-1                     | -                            |
| Mittel/intermediär                                  | 2-6                     | -                            |
| Hoch  | $\geq$ 7                | -                            |
| <b>Klinische Wahrscheinlichkeit: 2-Ebenen-Score</b> |                         |                              |
| LE unwahrscheinlich                                 | 0-4                     | 0-1                          |
| LE wahrscheinlich                                   | $\geq$ 5                | $\geq$ 2                     |

TVT = Venenthrombose, LE = Lungenembolie