

## Chronisch lymphatische Leukämie, Remissionskriterien

	Komplette Remission CR	Partielle Remission PR	Progressive Erkrankung PE
Symptome	keine	für mehr als 1 Monat	
Lymphknoten	keine > 1,5 cm	≥ 50 % Reduktion	≥ 50 % Zunahme
Leber und Milz	nicht palpabel	≥ 50 % Reduktion	≥ 50 % Zunahme
Hämoglobin	> 11 g/dl	> 11 g/dl oder ≥ 50% Zunahme	Abnahme > 2 g/dl (CLL-bedingt)
Granulozyten	> 1.500/μl	> 1.500/μl oder >50 % Zunahme	
Lymphozyten	< 4.000/μl	≥ 50 % Reduktion	≥ 50 % Erhöhung
Thrombozyten	> 100.000/μl	> 100.000/μl oder ≥ 50 % Besserung	Abnahme ≥ 50 % (CLL-bedingt)
Knochenmark	Normozellulär < 30 % Lymphozyten	50 % Abnahme Infiltration	

Quelle: Hallek M, Cheson B, Catovsky D, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute–Working Group 1996 guidelines. Blood 2008; 111: 5446-5456.